

Urinprov för klamydia och gonorré

Patientanvisning

Provtagning för följande analyser och undersökningar

- Klamydia och gonorré.

Provtagningsmaterial som du får från vårdgivaren eller laboratorium

- Plastmugg
- Multicollect-rör med provtagningspinne och pipett (provtagningsspinnen behövs ej för urinprov och kan kastas)
- Eventuell ytterhylsa för transport av prov.



Multicollect-rör



Ytterhylsa (om provet skickas med post)

Instruktion

1. Ta gärna provet på morgonen. Prov ska tas tidigast två timmar efter att du senast kissade.
2. Kissa ca 10 ml direkt i plastmuggen. Det är viktigt att det är den första urinen som hamnar i plastmuggen.
3. Sug upp urin med pipetten och fyll röret tills urinmängden når upp till mitten av fönstret på Multicollect-röret.
Röret innehåller vätska som behövs för transport till laboratoriet. Var försiktig så vätskan inte rinner ut när du öppnar röret.
4. Skruva på locket till röret.
5. Prov lämnas in hos din vårdgivare eller laboratorium där provtagningsmaterialet lämnats ut. Provet behöver inte förvaras kylt efter provtagning.

Provet kan postas om du har fått en förfrankerad transportpåse. Lägg provet (Multicollect-röret i ytterhylsa) och eventuell pappersremiss i den förfrankerade transportpåsen innan det postas.